

TECHNIKI STOSOWANIA PROFESJONALNYCH ŚRODKÓW DO DEZYNFEKcji

EXOsept P / ROKAnol P / ROKAnol PW

BROSZURA INSTRUKTAŻOWA

**UŻYWAĆ TYLKO NA OTWARTEJ LUB DOBRZE WENTYLOWANEJ PRZESTRZENI.
DEZYNFEKcja PRZED WEJŚCIEM DO OBIEKTÓW:**

AUTOMATYCZNA KOMORA/KURTyna DEZYNFEKcji – ZALECENIA

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


SZKOŁY, UCZELNIE, URZĘDY, SZPITALA





Dezynfekcja okrycia wierzchniego

- Odkazanie odbywa się podczas krótkotrwałego przebywania osoby w automatycznej komorze/kurtynie dezynfekcyjnej.
- Komora/kurtyna w tym czasie rozpyla płyn poprzez wytworzenie mgiełki z preparatu odkazającego.
- W czasie dezynfekcji należy zastronć oczy.
- Zalecany czas pojedynczego rozpylania **5-15 sekund**. Po przejściu przez komorę/kurtynę, rozpylony produkt odparowuje.
- W przypadku długotrwałego bezpośredniego działania należy stosować rękawice ochronne.

DWORCE, PORTY LOTNICZE



OBIEKTY SPORTOWE I KULTURY



Nie spożywać posiłków!



Nie palić!



Nie używać telefonów!



Chronić przed dziećmi!